ROSA NOISETTIANA."

R. Germinibus ovatis pedunculisque villosulis; foliolis glabris simpliciter argute crenatis; petiolis glanduloso-subtomentosis, aculeatis; caule aculeis validis, subrectis; floribus paniculatis. (N.)

LE ROSIER DE PHILIPPE NOISETTE.

DESCRIPTION.

Magnifique arbrisseau qui s'élève jusqu'à huit à dix pieds. Ses rameaux glabres sont armés d'aiguillons assez forts, un peu crochus, rougeâtres sur les branches florifères, et bruns sur les rameaux adultes. Les feuilles se composent de cinq à sept folioles ovales-pointues, rarement obtuses, glabres, vertes endessus, plus pâles en-dessous, simplement et finement créne-lées: elles sont portées par des pétioles velus, manis de plusieurs petits aiguillons recourbés qui s'étendent, par-fois, jusque sur la nervure de la foliole impaire. A la base de ce pétiole sont deux stipules bifides, pointues au sommet, denticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, latérales et terminales,

1) Habitus. Frutex magnitudine, circiter. 8 — 10 pedam. Canter, sobusti, aculeis sparsis armati. Aculei validi, insequales, subrecti. Follola, plerimque septenna, orbiculato-ovata, basi rotundata, apice partim acuta, partim obsusa, utrinque glabra. Pertoli subpubescentes, aculeati. Stipula lanccolate, acuminata, margine glandulose. Floris terminales, corymbos: corymbus bracteis sufficient. Paro eculi raro simplices, sapius in pediceites termos divisi, bracteis ad basin cigusve ramificationis praditi. Balcinata angunta, mineronata Calicia tubita obsungo-oviformis), pediniculi et pedicelli omnino villosuli. Lacinia carrolate minerone lineari terminata, appendiculate, intus albotomentesae, margine glandules ratio praedita. Conolla speciosa duplex, colore ex albo purpurascente, suavissame obcas. Paralla obcordata. Frictius ellipsoideus. Maturum

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

P. J. Redoute pina.

Imprimerie de Remond